

線形代数 I (担当 松下勝義)

教科書 §2.3-2.4, pp.13-26

II. 行列の階数と階段行列, 連立方程式の解

講義ノート

もし以下の連立一次方程式,

$$\hat{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \quad (69)$$

の解が一つに定まるとする. 一回目の講義で分かったように, その拡大係数行列,

$$\left(\hat{A} \quad \mathbf{b} \right) \quad (70)$$

の係数行列 \hat{A} を

$$\hat{I} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \dots & \ddots \end{pmatrix} \quad (71)$$

の形に直すことで

$$\left(\hat{A} \quad \mathbf{b} \right) \Rightarrow \left(\hat{I} \quad \mathbf{d} \right) \quad (72)$$

の \mathbf{d} から解を得ることができた.

ところが教科書にもあるように連立一次方程式は解が一つに定まるとは限らない. 場合によっては解が ∞ 個ある場合や, 解がない場合が存在する. これらの場合でも係数行列 \hat{A} は階段行列に行基本変形で変形できる. そしてそれを利用して解が存在するかどうかを知ることができる. 今回はこれらの場合の行列による解の存在の判定法を述べる.

- 階段行列次のような行列を階段行列と呼ぶ. ピボットという値が 1 の成分が存在しそれが以下の条件を満たす.

1. ピボットがない行のすべての成分は 0
2. ピボットより左にある成分はすべて 0
3. ピボットのある列の列番号を p_i としピボットを含む行の数を r ($< m$ で m は行列の行の数) とすると

$$p_1 < p_2 < \dots < p_{r-1} < p_r. \quad (73)$$

そして各ピボットを含む列ベクトルの成分はピボット以外で 0.

- 基本変形による階段行列への変形と階数
行列 \hat{A} は行基本変形で階段行列 \hat{B} に変形できる. このとき階段行列のピボットの数 r を $\text{rank}(\hat{A})$ と書き行列の階数と呼ぶ.
- 拡大係数行列の係数行列 \hat{A} の列数 n と階数 r に対して以下が成り立つ.
行基本変形で係数行列が階段行列 \hat{B} とベクトル \mathbf{d} からなる拡大係数行列へ変形できたとする.

$$\left(\hat{A} \quad \mathbf{b} \right) \Rightarrow \left(\hat{B} \quad \mathbf{d} \right) \quad (74)$$

- $d_{r+1} = \dots d_n = 0$ ではない. \Rightarrow 解なし
- $d_{r+1} = \dots d_n = 0$ かつ $r=n$ 解が一つ存在する.
- $d_{r+1} = \dots d_n = 0$ かつ $r < n$ 解が ∞ 個あり未定定数 $n-r$ 個で書ける.

- 解が一意に定まる場合 (例題 2.4(1))
連立一次方程式

$$\begin{cases} x - 2y - 3z = 4 \\ 2x + 3y + 4z = 4 \\ 3x - 4y - 7z = 10 \end{cases} \quad (75)$$

拡大係数行列の係数行列を行基本変形で階段行列へ変形する.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 4 \\ 3 & -4 & -7 & 10 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 & 3 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & -2 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 1 \end{pmatrix} \quad (76)$$

この場合階段行列は単位行列 \hat{I}_3 になり, \mathbf{d} の 0 ではない成分の数は 3, r も階数 (ピボット数) が 3 であり d_4 等はなく 0 とみなしてよい. 列の数 3 であるから解が一意であることがわかる.

- 解が無限に存在する場合 (例題 2.4(2))

$$\begin{cases} x - 2y - 3z = 4 \\ 2x + 3y + z = 1 \\ 3x - 4y - 7z = 10 \end{cases} \quad (77)$$

拡大係数行列の係数行列を行基本変形で階段行列へ変形する.

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & -2 & -3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & -4 & -7 & 10 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \boxed{1} & -2 & -3 & 4 \\ 0 & 7 & 7 & -7 \\ 3 & -4 & -7 & 10 \end{pmatrix} \quad (78)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \boxed{1} & -2 & -3 & 4 \\ 0 & 7 & 7 & -7 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \quad (79)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \boxed{1} & -2 & -3 & 4 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \quad (80)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \boxed{1} & -2 & -3 & 4 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (81)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \boxed{1} & -2 & -3 & 4 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (82)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & -1 & 2 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (83)$$

より $d_n \neq 0$ の数がピボットの数 $r = 2$ と一致している. また列の数 n は 3 で解が ∞ 個あり未知定数 c 一つで解が書けることが分かる. $z=c$ とすると

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & -1 \\ 0 & \boxed{1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (84)$$

より

$$\begin{cases} x - c = 2 \\ y + c = -1 \end{cases} \quad (85)$$

となる. よって解は

$$\begin{cases} x = 2 + c \\ y = -1 - c \\ z = c \end{cases} \quad (86)$$

である.

- 解が存在しない場合 (例題 2.4(3))

$$\begin{cases} x - 2y - 3z = 4 \\ 2x + 3y + z = 4 \\ 3x - 4y - 7z = 10 \end{cases} \quad (87)$$

拡大係数行列の係数行列を行基本変形で階段行列へ変形する.

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & -2 & -3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 3 & -4 & -7 & 10 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \boxed{1} & -2 & -3 & 4 \\ 0 & 7 & 7 & -4 \\ 3 & -4 & -7 & 10 \end{pmatrix} \quad (88)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \boxed{1} & -2 & -3 & 4 \\ 0 & 7 & 7 & -4 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \quad (89)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \boxed{1} & -2 & -3 & 4 \\ 0 & 7 & 7 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (90)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \boxed{1} & -2 & -3 & 4 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & -1 \\ 0 & 7 & 7 & -4 \end{pmatrix} \quad (91)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \boxed{1} & -2 & -3 & 4 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (92)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & -1 & 2 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (93)$$

より $d_n \neq 0$ の数が 3 で階数 (ピボットの数) $r = 2$ より大きい. そのため解はない. 実際, 解として (x, y, z) が存在するとすると,

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & -1 \\ 0 & \boxed{1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (94)$$

より

$$\begin{cases} x - z = 2 \\ y + z = -1 \\ 0 = 3 \end{cases} \quad (95)$$

となるため最後の式が矛盾してしまう.